

## Chapitre 2 - Généralités sur les suites

### I. Suites numériques

#### 1. Généralités

**Définition :** Une suite est une fonction  $u$  à valeurs réelles dont la variable est un entier naturel  $n$

- La suite est notée  $(u(n)), (u_n)$ .
- L'image de  $n$  par la fonction  $u$  est notée  $u(n)$  ou  $u_n$
- $u(n)$  ou  $u_n$  se nomme le terme de rang  $n$  de la suite
- $u_n$  se lit «  $u$  indice  $n$  »
- $u_n$  est le terme général de la suite
- $(u_n)$  ou  $(u_n)_n$  désigne l'ensemble des termes de la suite pour  $n \in \mathbb{N}$

**Définition :** L'ensemble de définition d'une suite est l'ensemble des entiers naturels  $\mathbb{N}$  ou une partie de celui-ci (lorsque la suite n'est définie que pour des entiers supérieurs à une valeur donnée).

Exemple 1 :

On considère les suites  $(u_n)_n$  et  $(v_n)_n$  définies pour tout entier naturel  $n$  par :

$$u_n = 2n^2 + 1 \quad \text{et} \quad \begin{cases} v_0 = 0 \\ v_{n+1} = 2v_n^2 + 1 \end{cases}$$

1. Calculer les trois premiers termes de chaque suite.
2. Calculer le 5ème terme de chaque suite.

Correction

1.  $u_0 = 1; u_1 = 2 \times 1^2 + 1 = 3$  et  $u_2 = 2 \times 2^2 + 1 = 9$   
 $v_0 = 0; v_1 = 2 \times 0^2 + 1 = 1$  et  $v_2 = 2 \times 1^2 + 1 = 3$
2. Le 5ème terme de la suite  $(u_n)$  est  $u_4 = 2 \times 4^2 + 1 = 33$   
 Le 5ème terme de la suite  $(v_n)$  est  $v_4 = 2 \times v_3^2 + 1$   
 Or  $v_3 = 2 \times v_2^2 + 1 = 2 \times 3^2 + 1 = 19$  d'où  $v_4 = 2 \times 19^2 + 1 = 723$

## 2. Modes de générations de suites

**Définition :** Une suite peut être définie

- par une fonction  $f$  de la variable  $n$ . Dans ce cas on a  $u_n = f(n)$ .
- par une relation de récurrence.  $(u_n)$  est alors définie par son 1<sup>er</sup> terme et une relation permettant de calculer un terme à partir d'un ou plusieurs termes précédents.
- par un algorithme.
- par un autre moyen, par exemple la suite des décimales de  $\pi$ .
- par un motif géométrique.

### a) Suite définie par une fonction $f$ de la variable $n$

La suite  $(u_n)_n$  définie sur  $\mathbb{N}$  par  $u_n = n^2 + 2n + 3$  est une suite définie par une fonction.

En effet, on a  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = f(n)$  où  $f$  est la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par

$$f(x) = x^2 + 2x + 3.$$

Par cette fonction  $f$ , on peut calculer « directement » n'importe quel terme de la suite  $(u_n)_n$ .

Exemple 2 : Calculer les quatre premiers termes de la suite  $(u_n)_n$ .

Correction :  $u_0 = 3; u_1 = 6; u_2 = 11$  et  $u_3 = 18$

### b) Suite définie par une relation de récurrence.

La suite  $(u_n)_n$  définie sur  $\mathbb{N}$  par  $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = 4u_n - 3 \end{cases}$  est une suite définie par son 1<sup>er</sup> terme

$u_0 = 2$  et par la relation de récurrence  $u_{n+1} = 4u_n - 3$ .

Pour calculer le terme  $u_p$ , il faut connaître tous les termes précédents.

Ces derniers s'obtiennent grâce à la relation de récurrence.

Exemple 3 : Calculer les quatre premiers termes de la suite  $(u_n)_n$ .

Correction :  $u_0 = 2; u_1 = 4 \times 2 - 3 = 5; u_2 = 4 \times 5 - 3 = 17$  et  $u_3 = 4 \times 17 - 3 = 65$

### c) Suite définie par un algorithme

L'algorithme ci-dessous définit aussi une suite. On utilise une « boucle Pour ».

```
A ← 1
Pour i allant de 1 à N
    A ← 3 × A + 2
Fin Pour
```

Cet algorithme calcule tous les termes de la suite les uns après les autres.

$u_0$  vaut 1.

Dans la boucle « Pour », On calcule ensuite  $3u_0 + 2$  c'est à dire  $u_1$  puis  $u_2, u_3, \dots, u_N$ .



## Correction

1. Dans  $OA_0A_1$  rectangle en  $A_0$ , d'après le théorème de Pythagore on a :

$$OA_1^2 = OA_0^2 + A_0A_1^2 = 1^2 + 1^2 = 2 \text{ donc } OA_1 = \sqrt{2}$$

2. De même, Dans  $OA_1A_2$  rectangle en  $A_1$ , d'après le théorème de Pythagore on a :


$$OA_2^2 = OA_1^2 + A_1A_2^2 = (\sqrt{2})^2 + 1^2 = 3 \text{ donc } OA_2 = \sqrt{3}$$

3. De même, Dans  $OA_2A_3$  rectangle en  $A_2$ , d'après le théorème de Pythagore on a :

$$OA_3^2 = OA_2^2 + A_2A_3^2 = (\sqrt{3})^2 + 1^2 = 4 \text{ donc } OA_3 = \sqrt{4}$$

4. De même, Dans  $OA_nA_{n+1}$  rectangle en  $A_n$ , d'après le théorème de Pythagore on a

$$OA_{n+1}^2 = OA_n^2 + A_nA_{n+1}^2 = d_n^2 + 1^2 = d_n^2 + 1 \text{ donc } OA_{n+1} = \sqrt{d_n^2 + 1}$$



### 3. Représentation graphique d'une suite

Exemple 6 : On considère la suite  $(u_n)_n$  définie par  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = -n^2 + 7n + 1$ .


Représenter les points  $A(n; u_n)$  dans un repère  $(O; I; J)$  du plan.

Correction : calculons les huit premiers termes de la suite  $(u_n)_n$  :

$$u_0 = -0^2 + 7 \times 0 + 1 = 1; u_1 = -1^2 + 7 \times 1 + 1 = 7; u_2 = -2^2 + 7 \times 2 + 1 = 11; u_3 = -3^2 + 7 \times 3 + 1 = 13; \\ u_4 = -4^2 + 7 \times 4 + 1 = 13; u_5 = -5^2 + 7 \times 5 + 1 = 11; u_6 = -6^2 + 7 \times 6 + 1 = 7; u_7 = -7^2 + 7 \times 7 + 1 = 1$$

On obtient donc les points  $A(0; u_0); \dots; A(7; u_7)$  qu'on place dans un repère  $(O; I; J)$  du plan.

$$A_0(0; 1); A_1(1; 7); A_2(2; 11); A_3(3; 13); A_4(4; 13); A_5(5; 11); A_6(6; 7); A_7(7; 1)$$



## II. Sens de variation d'une suite

### Définition :

- Une suite  $(u_n)_n$  est dite croissante si, pour tout  $n$ ,  $u_{n+1} \geq u_n$
- Une suite  $(u_n)_n$  est dite décroissante si, pour tout  $n$ ,  $u_{n+1} \leq u_n$
- Une suite  $(u_n)_n$  est dite constante si, pour tout  $n$ ,  $u_{n+1} = u_n$
- Une suite est monotone si elle est soit croissante, soit décroissante, soit constante.

**Propriété :** Lorsqu'une suite  $(u_n)_n$  est définie par une relation  $u_n = f(n)$  où  $f$  est une fonction monotone sur  $[0; +\infty[$ , la suite  $(u_n)$  est également monotone, de même monotonie que la fonction  $f$  sur  $[0; +\infty[$ .

Exemple 6 :

Étudier les variations des suites ci-dessous définies pour tout entier naturel par :

$$u_n = 4n + (-2)^n \quad v_n = 3n^2 - n + 1 \quad w_n = n^2 + 9n + 1 \quad \begin{cases} t_0 = 1 \\ t_{n+1} = t_n - (n+1)^2 \end{cases}$$

Correction

- $u_0 = 4 \times 0 + (-2)^0 = 0 + 1 = 1$   
 $u_1 = 4 \times 1 + (-2)^1 = 4 - 2 = 2$   
 $u_2 = 4 \times 2 + (-2)^2 = 8 + 4 = 12$   
 $u_3 = 4 \times 3 + (-2)^3 = 12 - 8 = 4$  donc  $(u_n)$  est ni croissante ni décroissante.

- $v_0 = 3 \times 0^2 - 0 + 1 = 1$   
 $v_1 = 3 \times 1^2 - 1 + 1 = 3 - 1 + 1 = 3$   
 $v_2 = 3 \times 2^2 - 2 + 1 = 12 - 2 + 1 = 11$   
 $v_3 = 3 \times 3^2 - 3 + 1 = 27 - 3 + 1 = 25$

donc  $(v_n)$  semble croissante. Démontrons que  $(v_n)$  est, en effet, croissante.

Soit  $n \in \mathbb{N}$ , on a :

$$v_{n+1} - v_n = (3(n+1)^2 - (n+1) + 1) - (3n^2 - n + 1) = 3(n+1)^2 - (n+1) + 1 - 3n^2 + n - 1$$

$$v_{n+1} - v_n = 3(n^2 + 2n + 1) - n - 1 - 3n^2 + n$$

$$v_{n+1} - v_n = 3n^2 + 6n + 3 - n - 1 - 3n^2 + n = 6n + 2$$

Or  $n \in \mathbb{N}$  donc  $n \geq 0$  donc  $6n + 2 \geq 2 > 0$  donc  $v_{n+1} - v_n > 0$  donc  $(v_n)$  est strictement croissante.

*Remarque :* on pouvait aussi remarquer que  $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = f(n)$  avec  $f(x) = 3x^2 - x + 1$  et donc étudier les variations de  $f$  puis en déduire celles de  $(v_n)$ .

- $w_0 = 0^2 + 9 \times 0 + 1 = 1$   
 $w_1 = 1^2 + 9 \times 1 + 1 = 1 + 9 + 1 = 11$   
 $w_2 = 2^2 + 9 \times 2 + 1 = 4 + 18 + 1 = 23$   
 $w_3 = 3^2 + 9 \times 3 + 1 = 9 + 27 + 1 = 37$

donc  $(w_n)$  semble croissante. Démontrons que  $(w_n)$  est, en effet, croissante.

Soit  $n \in \mathbb{N}$ , on a :

$$w_{n+1} - w_n = ((n+1)^2 + 9(n+1) + 1) - (n^2 + 9n + 1) = n^2 + 2n + 1 + 9n + 9 + 1 - n^2 - 9n - 1$$

$$w_{n+1} - w_n = 2n + 10$$

Or  $n \in \mathbb{N}$  donc  $n \geq 0$  donc  $2n + 10 \geq 10 > 0$  donc  $w_{n+1} - w_n > 0$  donc  $(w_n)$  est strictement croissante.

- Soit  $n \in \mathbb{N}$ , on a  $t_{n+1} - t_n = -(n+1)^2 < 0$ . En effet, un carré est toujours positif ou nul donc  $(n+1)^2 > 0$  avec  $n \in \mathbb{N}$  donc  $-(n+1)^2 < 0$  donc  $(t_n)$  est strictement décroissante.